

**1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS**

Furosemid Accord 10 mg/ml Injektions- oder Infusionslösung

**2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZUSAMMENSETZUNG**

Ein ml Lösung enthält 10 mg Furosemid.  
Jede 2-ml-Ampulle enthält 20 mg Furosemid (20 mg/2 ml).  
Jede 4-ml-Ampulle enthält 40 mg Furosemid (40 mg/4 ml).  
Jede 5-ml-Ampulle enthält 50 mg Furosemid (50 mg/5 ml).  
Jede 25-ml-Durchstechflasche enthält 250 mg Furosemid (250 mg/25 ml).

Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wirkung:

2 ml der sterilen Lösung enthalten ca. 7 mg Natrium.  
4 ml der sterilen Lösung enthalten ca. 15 mg Natrium.  
5 ml der sterilen Lösung enthalten ca. 19 mg Natrium.  
25 ml der sterilen Lösung enthalten ca. 93 mg Natrium.

Vollständige Auflistung der sonstigen Bestandteile, siehe Abschnitt 6.1.

**3. DARREICHUNGSFORM**

Injektions-/Infusionslösung

Klare, farblose oder nahezu farblose Lösung (pH: 8,0 bis 9,3).

**4. KLINISCHE ANGABEN****4.1 Anwendungsgebiete**

Wenn eine rasche Diurese erforderlich ist. Anwendung in Notfällen oder wenn eine orale Therapie nicht möglich ist. Die Anwendungsgebiete umfassen:

- *Ödeme und/oder Aszites infolge von Herz- oder Lebererkrankungen*
- *Ödeme infolge von Nierenerkrankungen (im Falle eines nephrotischen Syndroms steht die Behandlung der Grundkrankheit im Vordergrund)*
- *Lungenödem (z. B. im Falle einer akuten Herzinsuffizienz)*
- *Hypertensive Krise (zusätzlich zu anderen therapeutischen Maßnahmen)*

**4.2 Dosierung und Art der Anwendung**

Art der Anwendung: intravenös oder (in Ausnahmefällen) intramuskulär

Allgemein

Die parenterale Anwendung von Furosemid ist angezeigt in Fällen, in denen eine orale Anwendung nicht möglich oder nicht effizient ist (z. B. bei verminderter intestinaler Resorption) oder wenn ein rascher Wirkungseintritt erforderlich ist. Zur Erzielung einer optimalen Wirksamkeit und Unterdrückung einer Gegenregulation ist einer Furosemid-Dauerinfusion gegenüber wiederholten Bolusinjektionen generell der Vorzug zu geben.

Sofern verfügbar, sind die aktuellen klinischen Leitlinien zu beachten.

In Fällen, in denen eine Dauerinfusion von Furosemid zur Weiterbehandlung nach einer oder mehreren akuten Bolusdosen nicht möglich ist, sollte eine Weiterbehandlung mit niedrigen Dosen in kurzen Zeitintervallen (ca. 4 Stunden) der Vorzug gegenüber einer Behandlung mit höheren Bolusdosen in längeren Zeitabständen gegeben werden.

Die Therapie sollte individuell nach dem Ansprechen des Patienten eingestellt werden, um so ein maximales therapeutisches Ansprechen zu erreichen und die nötige Mindestdosis zur Aufrechterhaltung des Ansprechens zu bestimmen.

Intravenöses Furosemid muss langsam injiziert oder infundiert werden; eine Injektionsgeschwindigkeit von 4 mg/Minute darf nicht überschritten werden, und die Furosemid-Injektionslösung darf keinesfalls gemeinsam mit anderen Arzneimitteln in der gleichen Spritze verabreicht werden.

Furosemid sollte generell intravenös verabreicht werden. Eine intramuskuläre Verabreichung soll auf Ausnahmefälle beschränkt bleiben, in denen weder eine orale noch eine intravenöse Anwendung möglich ist. Es ist zu beachten, dass eine intramuskuläre Injektion nicht zur Behandlung von akuten Erkrankungen wie Lungenödem geeignet ist.

Erwachsene

Wenn keine Erkrankungen vorliegen, die eine Dosisreduktion erforderlich machen (siehe nachstehend), beträgt die für Erwachsene und Jugendliche über 15 Jahren empfohlene Initialdosis 20 mg bis 40 mg Furosemid intravenös (oder in Ausnahmefällen intramuskulär); die Maximaldosis variiert je nach individuellem Ansprechen.

Falls höhere Dosen erforderlich sind, sollten diese mittels Dosissteigerung in Schritten von 20 mg und nicht öfter als alle 2 Stunden gegeben werden.

Bei Erwachsenen beträgt die empfohlene Tageshöchstosis für Furosemid 1.500 mg.

Bei Verabreichung als Infusion kann Furosemid unverdünnt über eine Infusionspumpe mit konstanter Flussrate verabreicht werden. Alternativ kann die Lösung mit einer kompatiblen Trägerflüssigkeit verdünnt werden, z. B. physiologischer Kochsalzlösung oder Ringer-Laktat-Lösung. Die Infusionsgeschwindigkeit darf 4 mg/Minute nie überschreiten.

Die parenterale Anwendung von Furosemid ist angezeigt in Fällen, in denen eine orale Anwendung nicht möglich oder nicht effizient ist (z. B. bei verminderter intestinaler Resorption) oder wenn ein rascher Wirkungseintritt erforderlich ist. In Fällen der parenteralen Gabe wird empfohlen, so schnell wie möglich auf eine orale Verabreichung zu wechseln.

Kinder und Jugendliche (bis zum Alter von 18 Jahren)

Die Erfahrung bei Kindern und Jugendlichen ist beschränkt. Die intravenöse Anwendung von Furosemid bei Kindern und Jugendlichen unter 15 Jahren ist nur in Ausnahmefällen empfohlen.

Die Dosierung wird an das Körpergewicht angepasst, und der empfohlene Dosisbereich erstreckt sich von 0,5 bis 1 mg/kg Körpergewicht täglich bis zu einer maximalen Gesamttagesdosis von 20 mg.

Die Behandlung sollte so bald wie möglich auf eine orale Therapie umgestellt werden.

Nierenfunktionsstörungen:

Bei Patienten mit schweren Nierenfunktionsstörungen (Serumkreatinin > 5 mg/dl) wird empfohlen, eine Infusionsgeschwindigkeit von 2,5 mg Furosemid pro Minute nicht zu überschreiten.

Ältere Patienten

Die empfohlene Initialdosis beträgt 20 mg/Tag und kann allmählich gesteigert werden, bis das erforderliche Ansprechen erreicht ist.

Spezielle Dosisempfehlungen

Für Erwachsene richtet sich die Dosierung nach den nachstehend genannten Krankheitsbildern:

- *Ödeme infolge einer chronischen und akuten dekompensierten Herzinsuffizienz*

Die empfohlene Initialdosis ist 20 bis 40 mg täglich. Die Dosis kann nach Bedarf je nach Ansprechen des Patienten angepasst werden. Die Dosis sollte bei chronischer dekompensierter Herzinsuffizienz in zwei oder drei getrennten Einzeldosen pro Tag, und bei akuter dekompensierter Herzinsuffizienz als Bolusinjektion gegeben werden.

- *Ödeme infolge von Nierenerkrankungen*

Die empfohlene Initialdosis ist 20 bis 40 mg täglich. Die Dosis kann nach Bedarf je nach Ansprechen des Patienten angepasst werden. Die Gesamttagesdosis kann als Einzeldosis oder in mehreren separaten und über den Tag verteilten Dosen verabreicht werden.

Falls dies nicht zu einer optimalen Erhöhung der Flüssigkeitssauscheidung führt, muss Furosemid als intravenöse Dauerinfusion mit einer initialen Infusionsgeschwindigkeit von 50 bis 100 mg/Stunde verabreicht werden.

Vor Beginn der Verabreichung von Furosemid müssen eine Hypovolämie, eine Hypotonie sowie Störungen im Säure-Basen-Haushalt und im Elektrolythaushalt entsprechend korrigiert werden.

Bei Dialysepatienten liegt die übliche Erhaltungsdosis in einem Bereich von 250 bis 1.500 mg täglich.

Bei Patienten mit nephrotischem Syndrom muss die Dosis aufgrund

des Risikos einer höheren Inzidenz von Nebenwirkungen mit Vorsicht bestimmt werden.

– *Ödeme infolge von Lebererkrankungen*

Falls eine intravenöse Behandlung absolut erforderlich ist, sollte die Initialdosis in einem Bereich von 20 mg bis 40 mg liegen. Diese Dosis kann, falls erforderlich, je nach Ansprechen des Patienten angepasst werden. Die Gesamttagesdosis kann als Einzeldosis oder in mehreren separaten Dosen über den Tag verteilt verabreicht werden.

Furosemid kann in Kombination mit Aldosteronantagonisten eingesetzt werden, falls diese Arzneimittel als Monotherapie nicht ausreichend sind. Zur Vermeidung von Komplikationen wie orthostatische Regulationsstörungen, Störungen im Säure-Basen-Haushalt oder Elektrolythaushalt oder hepatischer Enzephalopathie muss die Dosis sorgfältig angepasst werden, um einen gleichmäßigen Flüssigkeitsverlust zu erreichen. Die Dosis kann bei Erwachsenen einen täglichen Gewichtsverlust von etwa 0,5 kg bewirken.

In Fällen von Aszites mit Ödem sollte der Gewichtsverlust durch erhöhte Diurese nicht mehr als 1 kg pro Tag betragen.

– *Lungenödem (bei akuter Herzinsuffizienz)*

Die zu verabreichende Initialdosis beträgt 40 mg Furosemid zur intravenösen Gabe. Falls es der Zustand des Patienten erfordert, kann eine weitere Injektion von 20 bis 40 mg Furosemid nach 30 bis 60 Minuten verabreicht werden.

Furosemid sollte zusätzlich zu anderen therapeutischen Maßnahmen angewendet werden.

– *Hypertensive Krise (zusätzlich zu anderen therapeutischen Maßnahmen)*

Die empfohlene Initialdosis bei hypertensiver Krise beträgt 20 bis 40 mg intravenös als Bolusinjektion. Die Dosis kann, falls erforderlich, je nach Ansprechen des Patienten angepasst werden.

#### 4.3 Gegenanzeigen

- Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff Furosemid oder einen der sonstigen Bestandteile.
- Patienten mit Anurie oder Nierenversagen mit Oligoanurie, die nicht auf Furosemid ansprechen.
- Nierenversagen infolge einer Vergiftung mit nephrotoxischen oder hepatotoxischen Substanzen.
- Nierenversagen in Verbindung mit hepatischem Koma.
- Patienten mit schwerer Hypokaliämie oder schwerer Hyponatriämie.
- Patienten mit Hypovolämie (mit oder ohne Hypotonie) oder Dehydratation.
- Patienten in präkomatösem oder komatösem Zustand in Verbindung mit hepatischer Enzephalopathie.

- Patienten mit Überempfindlichkeit gegen Sulfonamide (z. B. Sulfonylharnstoffe oder Antibiotika aus der Gruppe der Sulfonamide) könnten eine Kreuzallergie gegen Furosemid zeigen.
- Stillzeit (siehe Abschnitt 4.6).

#### 4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Eine sorgfältige Überwachung ist erforderlich bei

- Patienten mit teilweiser Harnabflussbehinderung (z. B. bei Prostatahyperplasie, Hydronephrose, Ureterstenose). Es muss für einen freien Harnabfluss gesorgt werden.
  - Patienten mit Hypotonie oder Patienten, für die ein starker Blutdruckabfall ein erhöhtes Risiko darstellt (Patienten mit koronarer Herzkrankung oder zerebrovaskulären Durchblutungsstörungen).
  - Patienten mit manifestem oder latentem Diabetes mellitus oder schwankenden Blutzuckerwerten (eine regelmäßige Kontrolle der Blutzuckerwerte ist erforderlich).
  - Patienten mit Gicht und Hyperurikämie (eine regelmäßige Kontrolle der Harnsäurewerte im Serum ist erforderlich).
  - Patienten mit Lebererkrankungen oder hepatorenalem Syndrom (Nierenfunktionsstörung in Verbindung mit schwerer Lebererkrankung).
  - Hypoproteinämie (in Verbindung mit nephrotischem Syndrom; die Wirkung von Furosemid kann reduziert und seine Ototoxizität verstärkt sein).
  - gleichzeitiger Anwendung mit Lithiumsalzen (eine Überwachung der Lithiumspiegel ist erforderlich, siehe Abschnitt 4.5).
  - akuter Porphyrie (die Anwendung von Diuretika bei akuter Porphyrie gilt als unsicher und es ist Vorsicht geboten).
  - In Fällen von Aszites mit Ödem sollte der Gewichtsverlust durch erhöhte Diurese nicht mehr als 1 kg pro Tag betragen.
  - Eine übermäßig starke Diurese kann zu orthostatischer Hypotonie oder zu akuten hypotensiven Zuständen führen.
  - Nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR) können die diuretische Wirkung von Furosemid und anderen Diuretika antagonisieren. Die Anwendung von NSAR gemeinsam mit Diuretika kann das Risiko einer Nephrotoxizität erhöhen.
  - Wenn erforderlich, sollten vor Therapiebeginn entsprechende Maßnahmen getroffen werden, um eine bestehende Hypotonie oder Hypovolämie zu korrigieren.
- Eine vorsichtige Dosistitration ist erforderlich bei
- Störungen des Elektrolythaushalts (z. B. Hypokaliämie, Hyponatriämie). Kaliumsubstitution und/oder Diätmaßnahmen könnten erforderlich sein, um eine Hypokaliämie zu vermeiden oder unter Kontrolle zu halten.

meiden oder unter Kontrolle zu halten.

- Störungen im Flüssigkeitshaushalt, Dehydratation, reduziertem Blutvolumen mit Kreislaufkollaps und Möglichkeit von Thrombosen und Embolien, vor allem bei älteren Patienten, bei übermäßiger Anwendung.
- Ototoxizität (bei zu schneller Verabreichung mit einer Geschwindigkeit von mehr als 4 mg pro Minute – gleichzeitige Anwendung anderer ototoxisch wirkender Arzneimittel kann dieses Risiko erhöhen, siehe Abschnitt 4.5.).
- Anwendung in hohen Dosen.
- Anwendung bei fortschreitender und schwerer Nierenerkrankung.
- Anwendung gemeinsam mit Sorbitol. Die gleichzeitige Anwendung beider Substanzen kann zu einer verstärkten Dehydratation führen (Sorbitol kann zu Diarrhoe führen und damit zu einem zusätzlichen Flüssigkeitsverlust).
- Anwendung bei Lupus erythematoses.
- Anwendung von Arzneimitteln, die das QT-Intervall verlängern.

Bei Patienten, die mit Furosemid behandelt werden, kann eine symptomatische Hypotonie mit Schwindel, Ohnmacht oder Bewusstlosigkeit auftreten. Das betrifft insbesondere ältere Menschen, Patienten, die gleichzeitig andere Arzneimittel einnehmen, die Hypotonie verursachen können, und Patienten mit anderen Erkrankungen, die mit einem Hypotonierisiko verbunden sind.

Frühgeborene (mögliche Entwicklung einer Nephrokalzinose/Nephrolithiasis; die Nierenfunktion muss überwacht und eine Nierensonographie durchgeführt werden). Bei Frühgeborenen mit Atemnotsyndrom kann eine diuretische Behandlung mit Furosemid in den ersten Lebenswochen das Risiko eines persistierenden Ductus arteriosus Botalli erhöhen.

Vorsicht ist geboten bei Patienten mit besonderem Risiko für einen Elektrolytmangel.

Eine regelmäßige Kontrolle von Serumnatrium, Serumkalium und Serumkreatinin wird während einer Therapie mit Furosemid generell empfohlen; eine besonders engmaschige Überwachung ist bei Patienten mit hohem Risiko für Elektrolytstörungen erforderlich oder im Fall eines wesentlichen zusätzlichen Flüssigkeitsverlustes (z. B. aufgrund von Erbrechen oder Diarrhoe).

Hypovolämie oder Dehydratation sowie wesentliche Störungen des Elektrolyt- und des Säure-Basen-Haushalts müssen entsprechend korrigiert werden. Dies könnte auch ein vorübergehendes Absetzen von Furosemid erforderlich machen.

Bei Patienten mit hohem Risiko für eine Kontrastmittel-Nephropathie wird Furosemid nicht zur Anwendung zur Diurese als Teil der Präventionsmaßnahmen gegen eine Kontrastmittel-induzierte Nephropathie empfohlen.

**Gleichzeitige Anwendung mit Risperidon**

Bei plazebokontrollierten Studien mit Risperidon an älteren Patienten mit Demenz wurde bei mit Furosemid plus Risperidon behandelten Patienten eine höhere Mortalitätsinzidenz beobachtet (7,3 %; mittleres Alter: 89 Jahre; Altersbereich: 75 bis 97 Jahre) als bei Patienten mit Risperidon alleine (3,1 %; mittleres Alter: 84 Jahre, Altersbereich: 70 bis 96 Jahre) oder mit Furosemid alleine (4,1 %; mittleres Alter: 80 Jahre, Altersbereich: 67 bis 90 Jahre). Die gleichzeitige Anwendung von Risperidon mit anderen Diuretika (hauptsächlich Thiaziddiuretika in niedriger Dosis) war nicht mit ähnlichen Befunden verbunden.

Es konnte kein pathophysiologischer Mechanismus zur Erklärung dieser Befunde gefunden werden, und es wurde auch kein einheitliches Muster für die Todesursachen beobachtet. Dennoch sollte Vorsicht geübt werden, und die Risiken und Nutzen dieser Kombination oder der Kombinations-therapie mit anderen stark wirkenden Diuretika sollten vor der Entscheidung über eine Anwendung entsprechend berücksichtigt werden. Bei Patienten, die andere Diuretika als Begleittherapie mit Risperidon erhielten, wurde keine erhöhte Mortalitätsinzidenz festgestellt. Ungeachtet der jeweiligen Behandlung war Dehydratation ein genereller Risikofaktor für die Mortalität und sollte daher bei älteren Patienten mit Demenz nach Möglichkeit vermieden werden (siehe Abschnitt 4.3 Kontraindikationen).

**Photosensibilität:** Fälle von Photosensibilitätsreaktionen wurden berichtet. Falls eine Photosensibilitätsreaktion während der Behandlung auftritt, wird ein Abbruch der Behandlung empfohlen. Falls eine erneute Anwendung als notwendig erachtet wird, wird empfohlen, die dem Sonnenlicht oder künstliche UV-A-Bestrahlung exponierten Hautbereiche entsprechend zu schützen.

**Anwendung zu Dopingzwecken**

Die Anwendung von Furosemid kann bei Dopingkontrollen zu positiven Ergebnissen führen.

Die gesundheitlichen Folgen der Anwendung von Furosemid als Dopingmittel können nicht abgesehen werden, schwerwiegende Gesundheitsgefährdungen sind nicht auszuschließen.

**Furosemid 10 mg/ml Injektions- oder Infusionslösung (2 ml, 4 ml und 5 ml)**

Dieses Arzneimittel enthält weniger als 1 mmol (23 mg) Natrium pro Ampulle, d.h., es ist nahezu „natriumfrei“.

**Furosemid 10 mg/ml Injektions- oder Infusionslösung (25 ml)**

Dieses Arzneimittel enthält ca. 93 mg Natrium pro Durchstechflasche, entsprechend 4,65 % der von der WHO für einen Erwachsenen empfohlenen maximalen täglichen Natriumaufnahme mit der Nahrung von 2 g.

**4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen****Nicht empfohlene Kombinationen****Lithium:**

Die Lithiumausscheidung kann durch Furosemid vermindert werden und so zu einer verstärkten kardiotoxischen Wirkung und zu Lithiumtoxizität führen. Daher wird diese Kombination nicht empfohlen (siehe Abschnitt 4.4). Falls diese Kombination als notwendig erachtet wird, sollten die Lithiumspiegel sorgfältig überwacht und die Lithiumdosis entsprechend angepasst werden.

**Risperidon:**

Es ist entsprechende Vorsicht geboten, und die Risiken und Nutzen dieser Kombination oder der Kombinationstherapie mit Furosemid mit anderen stark wirkenden Diuretika sollten vor einer Entscheidung über eine Anwendung entsprechend berücksichtigt werden. Siehe Abschnitt 4.4 „Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung“ hinsichtlich der erhöhten Mortalität bei älteren Patienten mit Demenz, die gleichzeitig Risperidon erhielten.

**Kombinationen, die Vorsicht bei der Anwendung erfordern****Ototoxische Arzneimittel (z. B. Aminoglykoside, Cisplatin):**

Furosemid kann die Ototoxizität bestimmter Arzneimittel wie z. B. Cisplatin oder Aminoglykosid-Antibiotika (z. B. Kanamycin, Gentamicin und Tobramycin) verstärken, vor allem bei Patienten mit beeinträchtigter Nierenfunktion. Da dies zu irreversiblen Schäden führen kann, dürfen diese Arzneimittel nur bei zwingenden medizinischen Gründen gemeinsam mit Furosemid angewendet werden.

**Chloralhydrat:**

In vereinzelt Fällen kann eine intravenöse Gabe von Furosemid innerhalb von 24 Stunden nach der Anwendung von Chloralhydrat zu Hitzegefühl, Schweißausbruch, Angstzuständen, Übelkeit, Blutdruckanstieg und Tachykardie führen. Eine gleichzeitige Anwendung von Furosemid und Chloralhydrat wird daher nicht empfohlen.

**Carbamazepin und Aminoglutethimid:**

Eine gleichzeitige Anwendung von Carbamazepin oder Aminoglutethimid kann das Risiko einer Hyponatriämie erhöhen.

**Andere Antihypertensiva:**

Die Wirkung bestimmter anderer Antihypertensiva (Diuretika und andere blutdrucksenkende Arzneimittel) kann durch die gleichzeitige Anwendung von Furosemid verstärkt werden.

**ACE-Hemmer und Angiotensin-II-Rezeptor-Antagonisten:**

Die Wirkungen anderer Antihypertensiva können durch die gleichzeitige Anwendung von Furosemid verstärkt

werden. Massiver Blutdruckabfall – im Extremfall bis zum Schock – und Verschlechterung der Nierenfunktion (in vereinzelt Fällen akutes Nierenversagen) wurden in Kombination mit ACE-Hemmern beobachtet, wenn der ACE-Hemmer zum ersten Mal oder erstmals in hoher Dosis (Erstdosis-Hypotonie) gegeben wurde. Nach Möglichkeit sollte die Furosemid-Therapie daher vorübergehend für drei Tage abgesetzt (oder zumindest in seiner Dosis reduziert werden), bevor eine Therapie mit einem ACE-Hemmer oder einem Angiotensin-II-Rezeptor-Antagonisten eingeleitet oder deren Dosis erhöht wird.

Bei Patienten, die Diuretika anwenden, kann eine verstärkte Hypotonie und eine Verschlechterung der Nierenfunktion eintreten; eine Beeinträchtigung der Nierenfunktion kann auch während der ersten gemeinsamen Anwendung oder bei der ersten Anwendung von hohen Dosen eines ACE-Hemmers oder eines Angiotensin-II-Rezeptor-Antagonisten auftreten.

**Thiazide:**

Infolge einer Wechselwirkung von Furosemid und Thiaziden tritt ein synergistischer diuretischer Effekt auf.

**Antidiabetika:**

Eine Verminderung der Glukosetoleranz kann auftreten, da Furosemid die Wirkung dieser Arzneimittel abschwächen kann.

**Metformin:**

Die Blutspiegel von Metformin können durch Furosemid erhöht werden, umgekehrt kann Metformin die Konzentration von Furosemid vermindern. Dieses Risiko ist verbunden mit einem vermehrten Auftreten einer Laktatazidose im Falle einer funktionellen Niereninsuffizienz.

Herzglykoside (z. B. Digoxin) und andere Arzneimittel, die eine Verlängerung des QT-Intervalls verursachen können:

Eine Verminderung der Kaliumspiegel kann die Digitalistoxizität verstärken; daher sollten die Kaliumwerte überwacht werden.

Manche Elektrolytstörungen können die Toxizität bestimmter gleichzeitig verabreichter Arzneimittel verstärken, die eine Verlängerung des QT-Intervalls verursachen können, z. B. Antiarrhythmika der Klassen Ia und III wie Amiodaron, Sotalol, Dofetilid, Ibutilid und Chinolone. Eine Überwachung der Kaliumspiegel im Plasma und des EKG wird empfohlen.

**Fibrate:**

Die Blutspiegel von Furosemid und Derivaten der Fibrinsäure (z. B. Clofibrat und Fenofibrat) können bei gleichzeitiger Anwendung erhöht sein (vor allem im Falle einer Hypalbuminämie). Die Wirkungsverstärkung/Toxizität sollte überwacht werden.

Nichtsteroidale Antirheumatika und hoch dosierte Salizylate:

Nichtsteroidale Antirheumatika (einschließlich Coxiben) können bei vorbestehender Hypovolämie ein akutes Nierenversagen auslösen und die diuretische, natriuretische und antihypertensive Wirkung abschwächen. Bei gleichzeitiger Anwendung mit hochdosierten Salizylaten kann sich die Prädisposition für eine Salicylattoxizität aufgrund einer verminderten renalen Ausscheidung oder einer Veränderung der Nierenfunktion verstärken.

Nephrotoxische Arzneimittel (z. B. Polymyxine, Aminoglykoside, Cephalosporine, Organoplatine, Immunsuppressiva, iodierter Kontrastmittel, Fos-carnet, Pentamidin):

Furosemid kann die nephrotoxischen Effekte nephrotoxischer Arzneimittel verstärken.

Antibiotika wie Cephalosporine - Bei Patienten, die eine Behandlung mit Furosemid und hohen Dosen bestimmter Cephalosporine erhalten, kann es zu einer Beeinträchtigung der Nierenfunktion kommen.

Es besteht ein Risiko für zytotoxische Wirkungen, wenn Cisplatin und Furosemid gemeinsam angewendet werden.

Zusätzlich kann die Nephrotoxizität von Cisplatin verstärkt werden, wenn Furosemid bei Anwendung zur forcierten Diurese während einer Cisplatin-Therapie nicht in niedriger Dosis (z. B. 40 mg bei Patienten mit normaler Nierenfunktion) und bei positiver Flüssigkeitsbilanz eingesetzt wird.

Arzneimittel mit ausgeprägter renal-tubulärer Sekretion:

Probenecid, Methotrexat und andere Arzneimittel, die wie Furosemid in der Niere in beträchtlichem Ausmaß tubulär sezerniert werden, können die Wirkung von Furosemid abschwächen. Andererseits kann Furosemid die renale Elimination dieser Arzneimittel vermindern. Im Falle einer hochdosierten Behandlung (insbesondere bei hoher Dosis von Furosemid und der anderen Arzneimittel) kann dies zu erhöhten Serumspiegeln und so zu einem erhöhten Risiko für Nebenwirkungen durch Furosemid oder diese Begleitmedikationen führen.

Periphere adrenerge Rezeptorenblocker:

Die Wirkungen dieser Arzneimittel können durch eine gemeinsame Anwendung von Furosemid verstärkt werden.

Phenobarbital und Phenytoin:

Bei einer gemeinsamen Anwendung dieser Arzneimittel kann es zu einer Abschwächung der Wirkung von Furosemid kommen.

Tubocurarin, Curarederivate und Succinylcholin:

Die muskelrelaxierende Wirkung dieser Arzneimittel kann durch Furosemid verstärkt oder verlängert werden.

Glukokortikoide, Carbenoxolon, Amphotericin B, Penicillin G, ACTH, Laxanzien und Lakritze:

Die gleichzeitige Anwendung von Furosemid mit Glukokortikoiden, Carbenoxolon, größeren Mengen Lakritze oder mit einer längerfristigen Anwendung von Laxanzien kann zu verstärktem Kaliumverlust führen. In Verbindung mit Glukokortikoiden muss eine Hypokaliämie berücksichtigt werden sowie eine Verstärkung einer solchen bei übermäßiger Anwendung von Laxanzien. Da dies zu irreversiblen Hörschäden führen kann, sollte diese Kombination nur eingesetzt werden, wenn dafür zwingende medizinische Gründe vorliegen.

Die Kaliumspiegel sollten überwacht werden.

Sucralfat:

Eine gleichzeitige Anwendung von Sucralfat und Furosemid kann die natriuretischen und antihypertensiven Wirkungen von Furosemid reduzieren. Patienten, die beide Arzneimittel erhalten, sollten engmaschig überwacht werden, um so zu bestimmen, ob die gewünschte diuretische und/oder antihypertensive Wirkung von Furosemid erzielt wird. Zwischen der Einnahme von Furosemid und Sucralfat sollte ein Zeitabstand von mindestens zwei Stunden liegen.

Orale Antikoagulanzen:

Furosemid verstärkt die Wirkungen oraler Antikoagulanzen.

Theophyllin:

Die Wirkungen von Theophyllin und Muskelrelaxanzien vom Curare-Typ können verstärkt werden.

Pressorische Amine (z. B. Adrenalin (Epinephrin), Noradrenalin (Norepinephrin):

Die gleichzeitige Anwendung von Furosemid kann die Wirkungen von pressorischen Aminen abschwächen.

Levothyroxin:

Hohe Dosen Furosemid können die Bindung von Schilddrüsenhormonen an Transportproteine inhibieren. Dadurch kann es zu einem anfänglichen, vorübergehenden Anstieg freier Schilddrüsenhormone kommen, insgesamt gefolgt von einer Abnahme des Gesamtschilddrüsenhormonspiegels. Die Schilddrüsenhormonspiegel sollten überwacht werden.

Sonstige Wechselwirkungen:

Die gleichzeitige Anwendung von Ciclosporin und Furosemid ist mit einem erhöhten Risiko für eine Arthritis urica verbunden.

Bei gleichzeitiger Anwendung mit Metolazon können schwerwiegende Diuresen auftreten.

#### 4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit

##### Schwangerschaft

Furosemid sollte in der Schwangerschaft nur bei Vorliegen zwingender

medizinischer Gründe angewendet werden. Furosemid passiert die Plazentaschranke und kann daher beim Fötus eine Diurese auslösen. Bei einer Behandlung während der Schwangerschaft ist eine Überwachung des fötalen Wachstums erforderlich.

Eine Behandlung von Schwangerschaftshypertonie und Ödemen wird im Allgemeinen nicht empfohlen, da dadurch eine physiologische Hypovolämie ausgelöst werden kann, die wiederum zu einer Verminderung der Perfusion der Plazenta führen kann.

Falls die Anwendung von Furosemid zur Behandlung von Herz- oder Niereninsuffizienz während der Schwangerschaft erforderlich ist, müssen Elektrolyte, Hämatokrit und Wachstum des Fötus sorgfältig überwacht werden. Eine mögliche Verdrängung von Bilirubin aus der Albuminbindung und somit ein erhöhtes Risiko für Kernikterus bei Hyperbilirubinämie wird für Furosemid diskutiert. Furosemid kann den Fötus für Hyperkalziurie, Nephrokalzinose und sekundäre Hyperparathyreose prädisponieren.

Furosemid erreicht im Nabelschnurblut 100 % der maternalen Serumkonzentration. Bisher wurden keine Fehlbildungen beim Menschen beschrieben, die mit einer Exposition mit Furosemid in Zusammenhang stehen könnten. Allerdings liegen nur beschränkte Erfahrungen zur schlüssigen Beurteilung einer potenziell schädigenden Wirkung für den Embryo/Fötus vor.

##### Stillzeit

Furosemid wird in die Muttermilch ausgeschieden und kann die Laktation hemmen. Frauen dürfen daher nicht stillen, wenn Sie mit Furosemid behandelt werden (siehe Abschnitt 4.3).

#### 4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Furosemid hat einen vernachlässigbaren Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

Patienten zeigen individuell unterschiedliche Reaktionen auf Furosemid.

Die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen können aufgrund der Behandlung mit Furosemid beeinträchtigt sein, insbesondere bei Behandlungsbeginn, bei Präparatewechsel oder im Zusammenwirken mit Alkohol.

#### 4.8 Nebenwirkungen

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig ( $\geq 1/10$ )

Häufig ( $\geq 1/100$  bis  $< 1/100$ )

Gelegentlich ( $\geq 1/1.000$  bis  $< 1/1.000$ )

Selten ( $\geq 1/10.000$  bis  $< 1/10.000$ )

Sehr selten ( $< 1/10.000$ )

Nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar).

Erkrankungen des Blutes und des Lymphsystems

Häufig: Hämokonzentration

Gelegentlich: Thrombozytopenie; eine Thrombozytopenie kann manifest werden, insbesondere mit erhöhter Blutungsneigung.

Selten: Eosinophilie, Leukopenie

Sehr selten: hämolytische Anämie, aplastische Anämie, Agranulozytose.

Erkrankungen des Immunsystems

Selten: schwere anaphylaktische und anaphylaktoide Reaktionen

Nicht bekannt: Exazerbation oder Aktivierung eines systemischen Lupus erythematoses

Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen

Sehr häufig: Elektrolytstörungen (einschließlich symptomatischer) Dehydratation und Hypovolämie (besonders bei älteren Patienten), Kreatinin im Blut erhöht, Triglyzeride im Blut erhöht.

Häufig: Hyponatriämie, Hypochlorämie, Hypokaliämie, Cholesterin im Blut erhöht, Harnsäure im Blut erhöht und Gichtanfälle, Urinvolumen erhöht.

Gelegentlich: eingeschränkte Glucose-toleranz

Nicht bekannt: Hypokalzämie, Hypomagnesiämie, Blutharnstoff erhöht, metabolische Alkalose, Pseudo-Barter-Syndrom

Erkrankungen des Nervensystems

Häufig: hepatische Enzephalopathie bei Patienten mit Leberinsuffizienz (siehe Abschnitt 4.3).

Selten: Parästhesie

Nicht bekannt: Schwindel, Ohnmacht und Bewusstlosigkeit (verursacht durch symptomatische Hypotonie), Kopfschmerzen.

Erkrankungen des Ohrs und des Labyrinths

Gelegentlich: Hörstörungen. Fälle von Taubheit (manchmal irreversibel) wurde nach der oralen oder intravenösen Anwendung von Furosemid berichtet (siehe Abschnitt 4.4).

Sehr selten: Tinnitus.

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts

Gelegentlich: Übelkeit

Selten: Erbrechen, Diarrhoe

Sehr selten: akute Pankreatitis

Leber- und Gallenerkrankungen

Sehr selten: Cholestase, Erhöhungen der Lebertransaminasen.

Gefäßkrankungen

Sehr häufig: Hypotonie einschließlich Orthostasesyndrom

Selten: Vaskulitis.

Nicht bekannt: Thrombose

Erkrankungen der Haut und des Unterhautgewebes

Gelegentlich: Pruritus, bullöse Dermatitis, Ausschläge, Urtikaria, Purpura, Erythema multiforme, Pemphigoid, Dermatitis exfoliativa, Lichtempfindlichkeitsreaktion

Nicht bekannt: Stevens-Johnson-Syndrom, toxische epidermale Nekrolyse, akute generalisierte exanthematische Pustulose (AGEP), Arzneimittel-exanthem mit Eosinophilie und systemischen Symptomen (DRESS), lichenoiden Reaktionen.

Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und Knochenkrankungen

Nicht bekannt: Fälle von Rhabdomyolyse wurden berichtet, oftmals im Zusammenhang mit schwerer Hypokaliämie (siehe Abschnitt 4.3).

Erkrankungen der Nieren und Harnwege

Sehr häufig: Kreatinin im Blut erhöht.

Selten: tubulointerstitielle Nephritis.

Nicht bekannt: Natrium im Urin erhöht, Chlorid im Urin erhöht, Harnretention (bei Patienten mit einer partiellen Harnabflussbehinderung (siehe Abschnitt 4.3), Nephrokalzinose und/oder Nephrolithiasis bei Frühgeborenen (siehe Abschnitt 4.4), Nierenversagen (siehe Abschnitt 4.5).

Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am Verabreichungsort

Selten: Fieber

Nicht bekannt: nach intramuskulärer Injektion können lokale Reaktionen wie Schmerzen auftreten.

Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen

Die Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen nach der Zulassung ist von großer Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses des Arzneimittels. Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzuzeigen.

**4.9 Überdosierung**

Das klinische Bild bei akuter oder chronischer Überdosierung ist in erster Linie vom Ausmaß und von den Folgen des Elektrolyt- und Flüssigkeitsverlustes (z. B. Hypovolämie, Dehydratation, Hämokonzentration, Herzrhythmusstörungen, einschließlich AV-Block und Kammerflimmern) aufgrund der übermäßigen Diurese abhängig.

Symptome

Zu den Symptomen solcher Störungen zählen schwere Hypotonie (bis zum Schock), akutes Nierenversagen, Thrombose, Delirium, schlaffe Lähmung, Apathie und Verwirrtheit.

Behandlung

Bei den ersten Zeichen von Schock (Hypotonie, Schwitzen, Übelkeit, Zyanose) muss die Injektion sofort abgebrochen und der Patient mit dem Kopf tief gelagert werden, wobei auf freie Atmung zu achten ist.

Flüssigkeitssubstitution und Korrektur der Störungen im Elektrolyt-Haushalt; Überwachung der Stoffwechsellage und Aufrechterhaltung des Harnflusses.

Eine Hypovolämie sollte mit den zur Verfügung stehenden Mitteln korrigiert werden, und ergänzend können künstliche Beatmung, Sauerstoff und im Falle eines anaphylaktischen Schocks Antihistaminika eingesetzt werden.

Es ist kein spezifisches Antidot für Furosemid bekannt. Im Falle einer Überdosierung während einer parenteralen Behandlung besteht die Behandlung grundsätzlich in einer entsprechenden Überwachung und unterstützenden Maßnahmen. Eine Hämodialyse beschleunigt die Elimination von Furosemid nicht.

**5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN****5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften**

Pharmakotherapeutische Gruppe: Diuretika, Sulfonamide, rein; ATC-Code: C03C A01

Furosemid ist ein starkes und schnell wirkendes Diuretikum. Aus pharmakologischer Sicht hemmt Furosemid das Co-Transport-System (Rückresorption) der Elektrolyte Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup> und 2Cl<sup>-</sup> an der luminalen Zellmembran im aufsteigenden Teil der Henle-Schleife. Die Effizienz von Furosemid hängt daher davon ab, dass das Arzneimittel das tubuläre Lumen über einen Anionentransportmechanismus erreicht. Die diuretische Wirkung ist eine Folge der Hemmung der Rückresorption von Natriumchlorid in diesem Abschnitt der Henle-Schleife. Der Anteil von ausgeschiedenem Natrium kann daher bis zu 35 % des glomerulär filtrierten Natriums betragen. Zu den sekundären Wirkungen der erhöhten Natriumausscheidung zählen eine Erhöhung der Harnausscheidung und eine Steigerung der distal-tubulären Kaliumsekretion. Die Ausscheidung von Kalzium- und Magnesiumsalzen ist ebenfalls erhöht.

Furosemid hemmt den Feedback-Mechanismus in der Macula densa und führt zu einer dosisabhängigen Stimulierung des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems.

Furosemid führt bei Herzinsuffizienz akut zu einer Senkung der Vorlast des Herzens (durch eine Erweiterung der Kapazität der venösen Blutgefäße). Dieser frühe vaskuläre Effekt wird wahrscheinlich durch Prostaglandine vermittelt und setzt eine entsprechende Nierenfunktion mit Aktivierung des Renin-Angiotensin-Systems und eine intakte Prostaglandinsynthese

voraus. Aufgrund seiner natriuretischen Wirkung vermindert Furosemid die Gefäßreaktivität auf Katecholamine, die bei hypertensiven Patienten erhöht ist.

Die diuretische Wirkung von Furosemid tritt innerhalb von 15 Minuten nach einer intravenösen Verabreichung ein.

Bei gesunden Personen, die Furosemid verabreicht erhielten (in Dosierungen von 10 bis 100 mg), wurde eine dosisabhängige Erhöhung der Diurese und Natriurese festgestellt. Die Wirkdauer bei gesunden Personen nach einer intravenösen Dosis von 20 mg Furosemid betrug ca. 3 Stunden, nach einer oralen Dosis von 40 mg etwa 3 bis 6 Stunden.

Bei kranken Patienten entspricht die Beziehung zwischen der tubulären Konzentration von freiem und gebundenem Furosemid (bestimmt anhand der Harnausscheidungsrate) und seiner natriuretischen Wirkung einer sigmoiden Kurve, wobei die minimal wirksame Ausscheidungsrate ungefähr 10 µg pro Minute beträgt. Eine Dauerinfusion von Furosemid ist daher wirksamer als wiederholte Bolusinjektionen. Wenn eine bestimmte Bolusdosis überschritten wird, erhöhen sich die Wirkungen von Furosemid nicht mehr signifikant. Bei reduzierter tubulärer Sekretion oder bei intratubulärer Bindung des Arzneimittels an Albumin ist die Wirksamkeit von Furosemid vermindert.

## 5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

### Verteilung

Das Verteilungsvolumen von Furosemid beträgt 0,1 bis 1,2 l/kg Körpergewicht. Das Verteilungsvolumen kann in Abhängigkeit von bestehenden Begleitkrankheiten erhöht sein.

Die Proteinbindung (zum Großteil an Albumin) ist höher als 98 %.

### Elimination

Furosemid wird zum Großteil in nicht konjugierter Form ausgeschieden, hauptsächlich über Sekretion am proximalen Tubus. Nach intravenöser Verabreichung wird Furosemid zu 60 % bis 70 % in dieser Form ausgeschieden. Der Glukuron-Metabolit von Furosemid macht 10 % bis 20 % der im Harn wiedergefundenen Substanzen aus. Die restliche Dosis wird über die Faeces ausgeschieden, höchstwahrscheinlich nach Sekretion in die Galle. Nach intravenöser Verabreichung liegt die Plasmahalbwertszeit von Furosemid bei 1 bis 1,5 Stunden.

Furosemid tritt in die Muttermilch über. Es passiert die Plazentaschranke und wird langsam auf den Fötus übertragen. Furosemid erreicht bei Mutter, Fötus und Neugeborenem ähnliche Konzentrationen.

### Nierenfunktionsstörungen

Bei beeinträchtigter Nierenfunktion erfolgt die Elimination von Furosemid langsamer und seine Halbwertszeit ist

verlängert. Bei Patienten mit terminaler Nierenkrankheit beträgt die durchschnittliche Halbwertszeit 9,7 Stunden. Bei schwerem Multiorganversagen kann die Halbwertszeit 20 bis 24 Stunden betragen.

Bei nephrotischem Syndrom führt die geringere Konzentration von Plasmaproteinen zu höheren Konzentrationen von nicht gebundenem Furosemid. Andererseits ist die Effizienz von Furosemid bei diesen Patienten aufgrund der intratubulären Albuminbindung und der verminderten tubulären Sekretion reduziert.

Furosemid zeigt bei Patienten mit Hämodialyse, Peritonealdialyse oder CAPD (chronische ambulatoire Peritonealdialyse) eine geringe Dialysekapazität.

### Leberfunktionsstörungen

Bei beeinträchtigter Leberfunktion erhöht sich die Halbwertszeit von Furosemid um 30 % bis 90 %, vor allem aufgrund des höheren Verteilungsvolumens. Die Elimination über die Galle kann reduziert sein (um bis zu 50 %). Bei diesen Patienten zeigt sich eine stärkere Variabilität der pharmakokinetischen Parameter.

### Dekompensierte Herzinsuffizienz, schwere Hypertonie, ältere Patienten

Bei Patienten mit dekompensierter Herzinsuffizienz, schwerer Hypertonie oder bei älteren Patienten ist die Elimination aufgrund der reduzierten Nierenfunktion verlangsamt.

### Frühgeborene und Neugeborene

Je nach Reifegrad der Nieren kann die Elimination von Furosemid verlangsamt sein. Bei Kindern mit unzureichender Glukuronidierungskapazität ist die Metabolisierung des Arzneimittels ebenfalls reduziert. Bei termingerecht geborenen Neugeborenen ist die Halbwertszeit generell weniger als 12 Stunden.

## 5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Studien zur chronischen Toxizität an Ratten und Hunden führten zu renalen Veränderungen (unter anderem zu fibröser Degeneration und renaler Kalzifizierung). Furosemid zeigte kein genotoxisches oder kanzerogenes Potenzial.

In Studien zur Reproduktionstoxikologie wurden nach Verabreichung hoher Dosen bei Rattenföten eine verminderte Zahl differenzierter Glomeruli, Skelettanomalien an Scapula, Humerus und Rippen (bedingt durch Hypokaliämie) und bei Mausföten und Kaninchenföten Hydronephrose beobachtet. Die Ergebnisse einer Studie an Mäusen und einer von den drei Studien an Kaninchen zeigten eine vermehrte Inzidenz und einen höheren Schweregrad von Hydronephrose (Dehnung des Nierenbeckens und in einigen Fällen des Ureters) bei Föten von behandelten Muttertieren im Vergleich zu jenen aus der Kontrollgruppe.

Frühgeborene Kaninchen, die Furosemid verabreicht erhielten, zeigten eine höhere Inzidenz von intraventrikulären

Blutungen als mit Kochsalz behandelte Jungtiere des gleichen Wurfs, möglicherweise aufgrund einer durch Furosemid induzierten intrakraniellen Hypotonie.

## 6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

### 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Natriumchlorid  
Natriumhydroxid  
Wasser für Injektionszwecke.

### 6.2 Inkompatibilitäten

Furosemid kann in Flüssigkeiten mit einem niedrigen pH-Wert Ausfällungen bilden. Dieses Arzneimittel darf abgesehen von den in Abschnitt 6.6 genannten Arzneimitteln mit keinen anderen Arzneimitteln gemischt werden.

### 6.3 Dauer der Haltbarkeit

Ungeöffnet (2-ml-, 4-ml- und 5-ml-Ampulle): 3 Jahre

Ungeöffnet (25-ml-Durchstechflasche): 2 Jahre

Nach dem ersten Öffnen: Das Arzneimittel sollte sofort nach dem Öffnen verwendet werden.

Nach Verdünnung: Die chemische und physikalische Stabilität der gebrauchsfertigen Lösung wurde für 24 Stunden bei 25 °C unter Lichtschutz nachgewiesen.

Aus mikrobiologischer Sicht sollte das gebrauchsfertige Arzneimittel sofort verwendet werden. Falls das Arzneimittel nicht sofort verwendet wird, liegen die Aufbewahrungsdauer und die Aufbewahrungsbedingungen vor der Anwendung in der Verantwortung des Anwenders und sollten im Normalfall nicht mehr als 24 Stunden bei 2 °C bis 8 °C betragen, es sei denn die Zubereitung erfolgte unter kontrollierten und validierten aseptischen Bedingungen.

### 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Aufbewahrung

Nicht über 25 °C lagern.

Nicht im Kühlschrank aufbewahren.

Die Ampulle / Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Lagerbedingungen des verdünnten Arzneimittels siehe Abschnitt 6.3.

### 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

20 mg in 2 ml: Bernsteinfarbene OPC-Ampulle mit zwei weißen ringförmigen Streifen und weißem Brechpunkt mit 2 ml Lösung.

40 mg in 4 ml: bernsteinfarbene, 5-ml-Ampulle mit weißem Brechring und blauem Band mit 4 ml Lösung.

50 mg in 5 ml: bernsteinfarbene, 5-ml-Ampulle mit weißem Brechring und weißem Band mit 5 ml Lösung.

250 mg in 25 ml: Durchstechflasche aus Typ-I-Braunglas mit Chlorobutyl-Gummistopfen und rotem Flip-off-Verschluss mit 25 ml Lösung.

**accord****Furosemid Accord 10 mg/ml  
Injektions- oder Infusionslösung**

## Packungsgrößen:

5,10 Ampullen mit 2 ml  
1, 5 oder 10 Ampullen mit 4ml  
5 oder 10 Ampullen mit 5 ml  
1, 5 oder 10 Durchstechflaschen mit  
25 ml

Es werden möglicherweise nicht alle  
Packungsgrößen in den Verkehr ge-  
bracht.

**6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen  
für die Beseitigung und sonstige  
Hinweise zur Handhabung**

Verdünnte Furosemid-Lösung (auf  
1 mg/ml) ist mit 0,9%iger NaCl-Infu-  
sionslösung und Compound Natrium-  
laktat-Infusionslösung für 24 Stunden  
kompatibel. Die Verdünnung der In-  
jektions- oder Infusionslösung muss  
unter aseptischen Bedingungen er-  
folgen.

Die Lösung ist vor der Anwendung  
auf Partikel und Verfärbung zu kon-  
trollieren. Die Lösung darf nur ver-  
wendet werden, wenn sie klar und  
frei von Partikeln ist. Nicht verwen-  
detes Arzneimittel oder Abfallmate-  
rialien ist entsprechend den nationa-  
len Anforderungen zu beseitigen. Nur  
zum einmaligen Gebrauch. Nicht ver-  
brauchter Inhalt ist zu entsorgen.

Furosemid Accord 10 mg/ml Injek-  
tions- oder Infusionslösung darf nicht  
mit anderen Arzneimitteln in der In-  
jektionsflasche gemischt werden.

**7. INHABER DER ZULASSUNG**

Accord Healthcare B.V.  
Winthontlaan 200  
3526 KV Utrecht  
Niederlande

**8. ZULASSUNGSNUMMER**

94284.00.00

**9. DATUM DER ERTEILUNG DER  
ZULASSUNG/VERLÄNGERUNG  
DER ZULASSUNG**

Datum der Erteilung der Zulassung:  
3. Februar 2016

Datum der letzten Verlängerung der  
Zulassung: 17. Dezember 2021

**10. STAND DER INFORMATION**

11/2024

**11. VERKAUFSABGRENZUNG**

Verschreibungspflichtig