

Rabattvertragsübersicht Nilotinib Accord Hartkapseln*

Stand: 01.04.2025

Krankenkasse ¹	Modell	Vertragsbeginn	Vertragsende
TK ²	Open House	01.02.2025	31.07.2025
GWQ ²	Open House	01.01.2025	30.06.2026
AOK Rheinland-Pfalz Saarland ²	Open House	01.02.2025	31.07.2027
AOK Bayern ²	Open House	01.03.2025	31.07.2027
AOK Sachsen-Anhalt ²	Open House	01.03.2025	31.07.2025
IKK classic ²	Open House	01.03.2025	28.02.2027

- 1) Die aktuelle Rabattvertragsübersicht finden Sie auf unserer Homepage unter: www.accord-healthcare.de/rabattvertraege

- 2) Ohne die Verabreichung dispergiert in Apfelmus

*Der Wirkstoff Nilotinib hat eine patentgeschützte Art der Anwendung: Für die orale Verabreichung des Wirkstoffs Nilotinib dispergiert in Apfelmus, unter anderem eingesetzt bei Patienten mit Schluckbeschwerden, besteht Patentschutz zugunsten der Novartis AG. TASIGNA® ist derzeit das einzige Nilotinib-Präparat, das aufgrund dieses bestehenden Patentschutzes dispergiert in Apfelmus verabreicht werden darf.

Nilotinib Accord 50 mg/ 150 mg/ 200 mg Hartkapseln

Wirkstoff Nilotinib. Zus.: Jede Hartkapsel enthält 50 mg/ 150 mg/ 200 mg Nilotinib. *Sonst. Best.: Kapselinhalt:* Lactose-Monohydrat, Crospovidon, Polysorbat 80, Magnesium-Aluminometasilikat, Hochdisperses Siliciumdioxid, Magnesiumstearat. *Kapselhülle Nilotinib Accord 50 mg u. 150 mg Hartkapseln:* Gelatine Titandioxid (E171), Eisen(III)-oxid (E172, rot), Eisen(III)-hydroxid-oxid x H₂O (E172, gelb). *Nilotinib Accord 200 mg Hartkapseln:* Gelatine, Titandioxid (E171), Eisen(III)-hydroxid-oxid x H₂O (E172, gelb). *Drucktinte:* Nilotinib Accord 50 mg u. 150 mg Hartkapseln: Schellack, Eisen(II,III)-oxid (E172, schwarz), Propylenglycol, Kaliumhydroxid. *Nilotinib Accord 200 mg Hartkapseln:* Schellack, Propylenglycol, Natriumhydroxid, Titandioxid (E171), Povidon, Allurarot AC. Anw.: *Erw./Kdr./Jugendl.:* Behandl. Neu diagn. Philadelphia-Chromosom pos. chron. myeloischer Leukämie (CML) in d. chron. Phase; *Erw.:* Behandl. Philadelphia-Chromosom pos. CML in d. chron. u. akzel. Phase mit Resistenz o. Unverträglichkeit ggü. einer Vorbehandl. einschl. Imatinib. Wirksamkeitsdaten zu Patienten mit CML in d. Blastenkrise liegen nicht vor; *Kdr./Jugendl.:* Behandl. Philadelphia-Chromosom pos. CML in d. chron. Phase mit Resistenz o. Unverträglichkeit ggü. einer Vorbehandl. einschl. Imatinib. Gegenanz.: Überempf. gg. Nilotinib od. sonst. Bestandteile. Nebenw.: *Sehr Häufig:* Inf. d. ob. Atemwege (einschl. Pharyngitis, Nasopharyngitis, Rhinitis), Anämie, Thrombozytopenie, Wachstumsverzög., Kopfschm., Husten, Übelkeit, Schm. i. Oberbauch, Obstipation, Diarrhö, Erbr., Hyperbilirubinämie (einschl. erh. Bilirubinwerte i. Blut), Exanthem, Pruritus, Alopezie, Myalgie, Arthralgie, Rückenschm., Schm. i. d. Extremitäten, Fatigue, Fieber, ALAT erh., Lipase erh.; *Häufig:* Follikulitis, Bronchitis, Candidose (einschl. Candidose i. Mund), Pneumonie, Gastroenteritis, Harnwegsinf., Leukopenie, Leukozytose, Neutropenie, Thrombozythämie, Hypothyreose, Elektrolytstör. (einschl. Hypomagnesiämie, Hyperkaliämie, Hypokaliämie, Hyponatriämie, Hypokalzämie, Hyperkalzämie, Hyperphosphatämie), Diabetes mellitus, Hyperglykämie, Hypercholesterinämie, Hyperlipidämie, Hypertriglyzeridämie, vermind. Appetit, Gicht, Hyperurikämie, Hypophosphatämie (einschl. ernied. Phosphorwerte i. Blut), Depression, Insomnie, Angst, Schwindelgefühl, Hypoästhesie, Parästhesien, Migräne, Konjunktivitis, trockene Augen (einschl. Xerophthalmie), Augenreizung, Hyperämie (skleral, konjunktival, okular), verschw. Sehen, Vertigo, Ohrschm., Tinnitus, Angina pectoris, Arrhythmien (einschl. AV Block, Herzflattern, ventrik. Extrasystolen, Tachykardie, Vorhofflimmern, Bradykardie), Palpitationen, QT-Zeit i. Elektrokardiogramm verl., koronare Herzkrankheit, Hypert., Hitzegefühl/Hautrötung, periph. arterielle Verschlusskr., Dyspnoe, Belastungsdyspnoe, Epistaxis, oropharyngealer Schmerz, Pankreatitis, Magenbeschw., aufgeblähter Bauch, Flatulenz, Bauchschm., Dyspepsie, Gastritis, gastroösophagealer Reflux, Hämorrhoiden, Stomatitis, Leberfkt.stör., nächtl. Schweißausbrüche, Ekzem, Urtikaria, Hyperhidrose, Kontusion, Akne, Dermatitis (einschl. allerg., exfoliative u. akneähnl.), Hauttrockenheit, Erythem, Muskuloskel. Schm. i. Brustraum, muskuloskel. Schm., Nackenschm., Muskelschwäche, Muskelspasmen, Knochenschm., Pollakisurie, Dysurie, Erektionsstör., Menorrhagie, Schm. i. Brustraum (einschl. nicht-kardialer Brustschmerz), Schm., Beschwerden i. Brustbereich, Unwohlsein, Asthenie u. periph. Ödem, Schüttelfrost, Influenza-ähnliches Krankheitsbild, Hämoglobin ernied., Blutamylase erh., AST erh., AP i. Blut erh., GGT erh., Blutkreatinkinase erh., Gewichtsabnahme, Gewichtszunahme, Kreatinin erh., Gesamtcholesterin erh.; *Gelegentlich:* Dehydratation, gesteigerter Appetit, Dyslipidämie, Hypoglykämie, zerebrovask. Störung, intrakranielle/zerebrale Blutungen, ischäm. Schlaganfall, transit. ischäm. Attacke, zerebraler Infarkt, Bewusstseinsverlust (einschl. Synkopen), Tremor, Beeintr. d. Aufmerksamkeit, Hyperästhesie, Dysästhesie, Lethargie, periph. Neuropathie, Restless-Legs-Syndr., Gesichtslähmung, Sehstörung, Bindehautblut., vermind. Sehschärfe, Lidödem, Blepharitis, Photopsie, allerg. Konjunktivitis, Doppeltsehen, Augenblutungen, Augenschm., Augenjucken, Augenschwellung, Erkr. d. Augenoberfläche, periorb. Ödem, Photophobie, Myokardinfarkt, Herzgeräusche, Perikarderguss, Herzinsuffizienz, diastolische Dysfkt., Linksschenkelblock, Perikarditis, Hypert. Krise, Claudicatio intermittens, periph. arterielle Stenose, Hämatom, Arteriosklerose, Hypot., Thrombose, Lungenödem, Pleuraerguss, interstitielle Lungenkrankheit, Pleuraschm., Pleuritis, Halsreizung, Dysphonie, pulm. Hypert., Keuchen, Gastrointestinale Blutungen, Meläna, Ulzeration i. Mund, Ösophagusschm., Mundtrockenheit, Zahnsensibilität (Hyperästhesie d. Zähne), Dysgeusie, Enterokolitis, Magengeschwür, Gingivitis, Hiatushernie, Rektalblutungen, exfoliatives Exanthem, Arzneimittellexanthem, Hautschm., Ekchymose, Gesichtsschwellung, Blasenbild., dermale Zysten, Erythema nodosum, Hyperkeratose, Petechien, Photosensitivität, Psoriasis, Hautverfärbungen, schuppige Haut, Hyperpigmentierung, Hypertrophie d. Haut, Hautulkus, Hepatotox., tox. Hepatitis, Ikterus, Cholestase, Hepatomegalie, Muskuloskel. Steifheit, Gelenkschwellungen, Arthritis, Flankenschm., verstärkter Harndrang, Nykturie, Chromaturie, Hämaturie, Niereninsuffizienz, Harninkontinenz, Brustschm., Gynäkomastie, Anschwellen d. Brustwarzen, Gesichtsödem, Stauungsödem, Gefühl d. Körpertemperaturänderung (einschl. Hitze- u. Kältegefühl), lokalisierte Ödeme, Blutlaktatdehydrogenase erh., Blutharnstoff erh., freies Bilirubin i. Blut erh., Parathyroidhormon i. Blut erh., Triglyzeride i. Blut erh., Globuline ernied., Lipoprotein-Cholesterin (einschl. Low Density u. High Density) erh., Troponin erh.; *Selten:* Hepatitis-B-Reaktivierung, Mundpapillome, Paraproteinämie, sekundärer Hyperparathyreoidismus, Thyreoiditis, Appetitstörungen, Tumor-Lyse-Syndr., Dysphorie, Stenose d. Arteria basilaris, Hirnödem, Optikusneuritis, Chorioretinopathie, Papillenödem, Zyanose, vermind. Ejektionsfraktion, Hämorrhagischer Schock, Pharyngolaryngeale Schm., Perforation Magen-Darm-Ulkus, Hämatemesis, Ösophagusulkus, ulzerierende Ösophagitis, retroperit. Blut., Subileus, Erythema multiforme, palmar-plantares Erythrodysästhesie-Syndr., Talgdrüsenhyperplasie, Hautatrophie, Brustverhärtung, plötzlicher Herztod, Blutzucker ernied., Blut-Insulin ernied., Blut-Insulin erh., Insulin-C-Peptid ernied.; *Nicht bekannt:* Ventrikuläre Dysfkt. Warnhinweis: Enthält Lactose und Allurarot. Verschreibungspflichtig. *Weitere Info siehe Fach- u. Gebrauchsinfo.* Zulassungsinhaber: Accord Healthcare B.V., Winthontlaan 200, 3526 KV Utrecht, Niederlande. Örtlicher Vertreter: Accord Healthcare GmbH, Hansastrasse 32, München, info@accord-healthcare.de. Stand: 09/2024.