

Save the Date

LIVE-WEBINAR

Praktische Anwendung der Kombinationstherapie beim Prostatakarzinom

PROGRAMM

Begrüßung und Einführung

Prof. Dr. med. Jennifer Kranz (Aachen)

Praktische Anwendung der Kombinationstherapie beim PCa: Erfahrungen mit der Kombination von Relugolix, Enzalutamid und Apalutamid

Prof. Dr. med. Peter Goebell (Erlangen)

Diskussion und Fragen

Teilnehmer:innen, Moderatorin und Referent

19. März 2025
19.00–20.30 Uhr
Jetzt teilnehmen!



3
CME-Punkte

Sollten Sie den Live-Termin am 19. März 2025 nicht wahrnehmen können, steht Ihnen das Seminar **ab dem 20. März** als **Video-on-Demand** zur Verfügung:



Die einzige orale ADT
Schnelle und anhaltende Senkung des Testosteronspiegels ohne Flare-up-Effekt¹



Mehr zu ORGOVYX®

1. Shore ND et al. N Engl J Med. 2020;382(4):2187–2196.

Orgovyx 120 mg Filmtabletten

▼ **Wirkstoff:** Relugolix. Zus.: Jede Filmtabl. enth. 120 mg Relugolix. **Sonst. Best.:** Mannitol (E421), Croscarmellose-Natrium (E468), Hydroxypropylcellulose (E463), Magnesiumstearat (E572), Hypromellose (E464), Titandioxid (E171), Eisen(III)-oxid (E172), Carnaubawachs (E903). **Anw.:** Behandl. v. erw. Pat. mit fortgeschritt. hormonsensitivem Prostatakarzinom. **Gegenanz.:** Überempf. gg. Wirkstoff od. sonst. Best. **Nebenw.:** *Sehr häufig:* Hitzewall., Diarrhoe^a, Obstip., Schm. d. Musk.- u. Skelettsystems^b, Ermüd.^c. *Häufig:* Anämie, Gynäkomastie, Schlaflosig., Depress., Schwindelgef., Kopfschm., Hypertonie, Übelk., Hyperhidrosis, Ausschlag, Libido verm., Gewicht erh., Glukose erh.^d, Triglyzerid erh.^d, Cholesterin im Blut erh.^e. *Gelegentlich:* Urtikaria, Angioöd., Osteopor./Osteopenie, Aspartat-Aminotransferase erh., Alanin-Aminotransferase erh.^d, Myokardinfarkt. *Nicht bekannt:* QT Verläng. ^aUmfasst Diarrhoe u. Kolitis; ^bumfasst Arthralgie, Rückenschm., Schm. in d. Gliedmaßen, Schm. d. Muskel- u. Skelettsystems, Myalgie, Knochenschm., Nackenschm., Arthritis, muskuloskel. Steifigkeit, Thoraxschm. nicht kardialen Urspr., Wirbelsäulenschm. u. muskuloskel. Beschw.; ^cumfasst Ermüdung u. Asthenie; ^dErhö. Grad 3/4, die durch Überwachung mittels klin. Laboruntersuch. festgest. wurde; ^ekeine Cholesterinerhö. > Grad 2 gemeldet. **Warnhinweise:** Trockenmittel nicht schlucken. **Verschreibungspflichtig.** Weitere Informationen siehe Fach- und Gebrauchsinfo. **Zulassungsinhaber:** Accord Healthcare S.L.U., World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n, Edifici Est 6a planta, 08039 Barcelona, Spanien. **Örtlicher Vertreter:** Accord Healthcare GmbH, Hansastrasse 32, München, info@accord-healthcare.de. **Stand:** 10-2024.