

Rabattvertragsübersicht

Dabigatran Accord, Dimethyl fumarate Accord, Pirfenidon Accord, Tolvaptan Accord, Imatinib Accord + Capecitabin Accord

Stand: 01.09.2025

Dabigatran Accord

Krankenkasse ¹	Modell	Vertragsbeginn	Vertragsende
DAK	Semi-Exklusiv	01.04.2025	31.03.2027
KKH	Semi-Exklusiv	01.04.2025	31.03.2027
TK/HEK/HKK	Semi-Exklusiv	01.04.2025	31.03.2027
Knappschaft	Open House	01.04.2024	28.02.2026
Barmer	Semi-Exklusiv	01.04.2025	31.03.2027

Dimethyl fumarat Accord

Krankenkasse ¹	Modell	Vertragsbeginn	Vertragsende
AOK Baden-Württemberg	Open House	01.10.2025	31.12.2025
AOK Bayern	Open House	01.09.2025	31.05.2026
AOK Bremen/Bremerhaven	Open House	01.09.2025	30.06.2026
AOK Hessen	Open House	01.09.2025	30.04.2026
AOK Niedersachsen	Open House	01.09.2025	31.01.2027
AOK Nordost	Open House	01.09.2025	31.07.2026
AOK Nordwest	Open House	01.09.2025	31.01.2027
AOK Plus	Open House	01.09.2025	31.01.2026
AOK Rheinland/Hamburg	Open House	01.09.2025	30.09.2026

AOK Rheinland-Pfalz/Saarland	Open House	01.09.2025	31.03.2027
AOK Sachsen-Anhalt	Open House	01.09.2025	28.02.2027
GWQ	Open House	01.09.2025	30.06.2026
IKK classic	Open House	01.09.2025	30.06.2026
KKH	Open House	01.10.2025	30.06.2026
SpectrumK	Open House	01.09.2025	31.08.2027

Pirfenidon Accord

Krankenkasse¹	Modell	Vertragsbeginn	Vertragsende
AOK	Exklusiv	01.02.2024	31.01.2026
Barmer	Exklusiv	01.07.2024	30.06.2026
DAK	Exklusiv	01.07.2024	30.06.2026
KKH	Exklusiv	01.07.2024	30.06.2026
spectrumK	Semi-Exklusiv	01.10.2023	30.09.2025
Knappschaft	Semi-Exklusiv	01.05.2025	30.04.2027

Tolvaptan Accord

Krankenkasse¹	Modell	Vertragsbeginn	Vertragsende
AOK	Exklusiv	01.06.2025	31.05.2027
DAK	Exklusiv	01.07.2024	30.06.2026
Barmer	Exklusiv	01.07.2024	30.06.2026
KKH	Exklusiv	01.07.2024	30.06.2026

Capecitabin Accord

Krankenkasse ¹	Modell	Vertragsbeginn	Vertragsende
AOK	Semi-Exklusiv	01.10.2024	30.09.2026
Barmer	Semi-Exklusiv	01.04.2024	31.03.2026
DAK	Semi-Exklusiv	01.04.2024	31.03.2026
GWQ	Semi-Exklusiv	01.01.2025	31.12.2026
spectrumK	Semi-Exklusiv	01.07.2024	30.06.2026
Knappschaft	Semi-Exklusiv	01.10.2024	30.09.2026
KKH	Semi-Exklusiv	01.04.2024	31.03.2026

Imatinib Accord

Krankenkasse ¹	Modell	Vertragsbeginn	Vertragsende
AOK	Exklusiv	01.10.2024	30.09.2026
GWQ	Semi-Exklusiv	01.07.2024	31.12.2025
Barmer	Semi-Exklusiv	01.07.2024	30.06.2026
IKK classic	Semi-Exklusiv	01.01.2024	31.12.2025
TK	Semi-Exklusiv	01.07.2024	30.06.2026
DAK	Semi-Exklusiv	01.07.2024	30.06.2026
KKH	Semi-Exklusiv	01.07.2024	30.06.2026
SpectrumK	Exklusiv	01.07.2024	30.06.2026

Die aktuelle Rabattvertragsübersicht finden Sie auf unserer Homepage unter: www.accord-healthcare.de/rabattvertraege

1) Der Rabattvertrag wurde für den jeweiligen Wirkstoff für fest definierte Wirkstärken und Packungsgrößen geschlossen; detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte aus Ihren Arzt-/Apothekensystemen.

Leberfkt.; schwere Beeinträcht. der Nierenfkt. (Kreatinin-Clearance < 30 ml/min); Kürzl. oder gleichzeitig. Behandl. mit Brivudin; Wenn für eines der Arzneim. der Kombinationsther. Gegenanz vorliegen. **Nebenw. einer Capecitabin-Monotherapie:** *Sehr häufig (Alle Schweregrade):* Anorexie, Diarrhö, Erbr., Übelk., Stomatitis, Bauchschm., Palmo-plantares Erythrodyssäthesie Syndr., Abgeschlagenh., Asthenie. *Häufig (Alle Schweregrade):* Herpes-Virusinfekt., Nasopharyngitis, Infekt. d. unt. Atemw. Neutrop., Anämie, Dehydratierung, Gewichtsabn., Schlaflosigk., Depression, Kopfschmerz, Lethargie, Schwindel, Parästhesie, Stör. d. Geschmacksempf., erhöh. Tränenfluss, Konjunktivitis, Augenreiz, Thrombophlebitis, Dyspnoe, Epistaxis, Husten, Rhinorrhö, Gastrointest. Blutung, Verstopfung, Oberbauchbeschw., Dyspepsie, Flatulenz, Mundtrockenh., Hyperbilirubinämie, abweich. Leberfkt.werte., Ausschlag, Alopezie, Erythem, trock. Haut, Pruritus, Hyperpigment. der Haut, makuläre Rötung, Abschuppung der Haut, Dermatitis, Pigmentierungsstör., Nagelstör., Gliederschm., Rückenschm., Arthralgie, Pyrexie, peripheres Ödem, Unwohlsein, Brustschm. *Gelegentlich (Schwewiege oder lebensbedrohliche (Grad 3-4) oder als medizinisch relevant betrachtete Nebenwirkungen):* Sepsis, Infekt. d. Harnwege, Zellulitis, Tonsillitis, Pharyngitis, orale Candidiasis, Influenza, Gastroenteritis, Pilzinfekt., Infekt., Zahnabszess, Lipom, Febr. Neutrop., Panzytop., Granulozytop., Thrombozytop., Leukop., hämolyt. Anämie, erhöh. d. International Normalised Ratio (INR)/Prothrombinzeit verläng., Hypersens., Diabetes, Hypokalämie, Appetitstör., Unterernährung, Hypertriglyzeridämie, Verwirrth., Panikattacken, gedrückte Stimmung, vermind. Libido, Aphasie, Beeinträcht. d. Gedächtn., Ataxie, Synkopen, Gleichgewichtsstör., sens. Stör., periph. Neuropathie, red. Sehschärfe, Doppelsehen, Vertigo, Ohrenschm., instabile Angina, Angina pectoris, Myokardischämie/infarkt, Vorhofflimmern, Arrhythmie, Tachyk., Sinustachyk., Palpitat., tiefe Venenthromb., Hypert., Punktblut, Hypot., Nitzwallungen, periph. Kältegefühl, Lungenembolie, Sehstör., trock. Augen, Augenschm., Sehschwäche, verschw. Sehen, Tinnitus, Hörschwäche, Vorhofflimmern, Herzischämie/Herzinfarkt, Ösophagitis, Unwohlsein im Bauch, Gastroösophagusreflux, Kolitis, Blut im Stuhl, Gelbsucht, Blasenbildung, Hautgeschwüre, Rötung, Urtikaria, Lichtempfindlichkeitskr., palmares Erythem, Schwell. im Gesicht, Purpura, Radiation-Recall-Syndr., Gelenkschwell., Knochenschm., Gesichtsschm., Skelettmuskelsteifh., Muskelschwäche, Hydronephrose, Harninkont., Hämaturie, Nokturie, Erhöhd. d. Kreatinin im Blut, Vaginalblut., Ödem, Schüttelfrost, grippear. Krankheitsgef., Rigor, erhöh. Körpertemp. *Selten (Erfahrung nach der Markteinführung):* Angioödem, Tränenkanalstenose, Hornhauterkrank., Keratitis, Keratitis punctata, Kammerfimm., QT-Verläng., Torsade de pointes, Bradykardie, Vasospasmus, Leberversagen, cholestat. Hepatitis, Kutaner Lupus erythemat. *Sehr selten (Erfahrung nach der Markteinführung):* Tox. Leukoenzephalopathie, schw. Hautrkt. wie SJS. u. TEN. **Nebenw. einer Capecitabin-Kombinationstherapie:** *Sehr häufig (Alle Schweregrade):* Neutrop., Leukop., Anämie, neutropen. Fieber, Thrombozytop., vermind. Appetit, Parästhesie, Dysästhesie, periph. Neuropathie, periph. sensor. Neuropathie, Dysgeusie, Kopfschm., erhöh. Tränensekret., Ödeme an d. unt. Extremitäten, Hypert., Embolie u. Thrombose, Halschm., Pharynxdysästhesie, Verstopfung, Dyspepsie, Alopezie, Nagelstör., Myalgie, Arthralgie, Schm. in d. Extremitäten, Pyrexie, Schwäche, Lethargie, Temperaturempfindlichk. *Häufig (Alle Schweregrade):* Herpes zoster, Infekt. d. Harnwege, Mundcandidiasis, Infekt. d. ob. Atemwege, Rhinitis, Influenza, Infekt., oraler Herpes, Knochenmarksdepression, febr. Neutrop., Hypersens., Hypokal., Hyponatri., Hypomagnesi., Hypokalz., Hyperglyk., Schlafstör., Angst, Neurotox., Tremor, Neuralgie, Überempfindlichkeitskr., Hypoästhesie, Sehstör., trock. Augen, Augenschm., Sehschwäche, verschw. Sehen, Tinnitus, Hörschwäche, Vorhofflimmern, Herzischämie/Herzinfarkt, Flushing, Hypotonie, hypertens. Krisen, Hitzewallung, Phlebitis, Schluckauf, Pharyngolaryngealschm., Dysphonie, Blutung, im ob. Bauchbereich, Mundulzera., Gastritis, Spannungsgef. im Bauch, Refluxgastroösophagitis, Mundschm., Dysphagie, Rektalblut., Unterbauchbeschw., orale Dysästhesie, orale Parästhesie, orale Hypoästhesie, Bauchbeschw., Abweich. Leberfkt.werte, Hyperhidrose, erythematöser Hautausschlag, Urtikaria, nächtl. Schwitzen, Kieferschm., Muskelspasmen, Trismus, Muskelschw., Hämaturie, Proteinurie, erniedr. renale Kreatinin-clearance, Dysurie, Mukositis, Gliederschm., Schm., Schüttelfrost, Brustschm., grippeähnli. Krankheitsgef., Fieber, infusionsbed. Reakt., Reakt. an d. Injektionsstelle, Schm. an der Infusionsstelle, Schm. an der Injektionsstelle, Kontusion. *Selten (Erfahrung nach der Markteinführung):* Akutes Nierenvers. als Folge v. Dehydratation. **Warnhinweis:** Enthält Lactose. **Verschreibungspflichtig.** *Weitere Informationen siehe Fach- und Gebrauchsinfo.* **Zulassungsinhaber:** Accord Healthcare S.L.U., World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n, Edifici Est 6ª planta, 08039 Barcelona, Spanien. **Örtlicher Vertreter:** Accord Healthcare GmbH, Hansastraße 32, 80686 München, info@accord-healthcare.de. **Stand:** 12/2021

Imatinib Accord 100 mg/ 400mg Filmtabletten

Zus.: Jede Filmtabl. enthält als Wirkstoff: 100 mg Imatinib (als Mesilat). Jede Filmtabl. enthält 400 mg Imatinib (als Mesilat). *Sonst. Best.:* Tablettenkern: Hypromellose 6 cps (E 464), Mikrokristalline Cellulose ph 102, Croscopovidon, Hochdisperses Silliciumdioxid, Magnesiumstearat. Tablettenüberzug: Hypromellose 6 cps (E 464), Talcum (E 553b), Polyethylenglycol, Eisen(III)-hydroxid-oxid x H₂O (E 172), Eisen(III)-oxid (E 172). **Anw.:** Imatinib Accord ist angezeigt: Erw. u. Kdr. m. neu diagnostiz. Philadelphia-Chromosom (bcr-abl)-pos. (Ph+) chron. myelo. Leukämie (CML), für d. Knochenmarktransplant. als Erstbehandl. nicht i. Betracht gezogen wird; Erw. u. Kdr. m. Ph+ CML i. d. chron. Phase nach Versagen Interferon-Alpha-Ther., i. d. akzelerierten Phase o. i. d. Blastenkrise; Erw. u. Kdr. m. neu diagnostiz. Philadelphia-Chromosom-pos. akuter lymphat. Leukämie (Ph+ ALL) i. Kombi. m. Chemother.; Erw. m. rezidiv. o. refrakt. Ph+ ALL als Monother.; Erw. m. myelodysplast./myeloproliferativen Erkrank. (MDS/MPD) i. Verbindung m. Genumlagerungen d. PDGF-Rezeptors (platelet-derived growth factor); Erw. m. fortgeschrit. hypereosinophiles Syndr. (HES) u./o. chron. eosinophiler Leukämie (CEL) m. FIP1L1-PDGFRa-Umlagerung; Behandl. c-Kit-(CD 117)-pos. nicht resezierbarer u./o. metastasierter maligner gastrointest. Stromatumoren (GIST) bei Erw.; adjuv. Behandl. Erw. mit signif. Risiko eines Rezidiv nach Resektion c-Kit-(CD 117)-positiver GIST. Pat. mit einem niedrigem Rezidivrisiko sollten keine adju. Behandl. erhalten; Erw. m. nicht resezierbarem Dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) u. Erw. m. rezidier. u./o. metastasier. DFSP, d. nicht für chirurgischen Eingriff i. Betracht kommen. Wirkung auf d. Ergebnis einer Knochenmarktransplantation nicht untersucht. **Gegenanz:** Überempfindlichkeit geg. d. Wirkstoff o. einen d. sonst. **Best. Frauen i. gebärfähig.** **Alter:** währ. Behandl. und für mind. 15 T. nach Beendigung der Behandl. zuverläs. Verhütungsmethode. **Schwang.:** darf b. Schwangeren nicht angewend. werden, es sei denn eindeutig erforderl. Pat.in muss u. Risiko f. Fötus aufgeklärt werden. **Stillzeit:** während und für mind. 15 T. nach Beendigung der Behandl. nicht stillen **Fertilität:** in tierexperiment. Studien keine Auswirk. B. Besorgnis Abspr. m. Arzt. **Nebenw.:** *Sehr Häufig:* Neurozytop., Thrombozytop., Anämie, Kopfschm., Übelk., Durchfall, Erbr., Dyspepsie, Abdominalschm., periorbitale Ödeme, Dermatitis/Ekzem/Hautausschlag, Muskelspasmen u. Muskelkrämpfe, Muskel- und Skelettschm. einschl. Myalgie, Arthralgie, Knochenschm., Flüssigkeitsret. u. periph. Ödeme, Müdigkeit, Gewichtszunahme. *Häufig:* Panzytopenie, fiebrige Neurozytop., Appetitlosigk., Schlaflosigk., Schwindel, Parästhesie, Geschmacksstör., Hypästhesie, Augenlidödem, vermehrter Tränenfl., Bindehautblutung, Konjunktivitis, trockene Augen, verschwommenes Sehen, plötzl. Hautröt. (Flushes), Hämorrhagie, Dyspnoe, Epistaxis, Husten, Flatulenz, geblähter Bauch, Magen- und Speiseröhrenreflux, Verstopfung, Mundtrockenheit, Gastritis, erhöh. Leberenz., Pruritus, Gesichtsoedem, trockene Haut, Erythem, Alopezie, nächtl. Schwitzen, Lichtempfindlichkeitskr., Anschwellen d. Gelenke, Schwäche, Fieberzustand, general. Ödeme d. Unterhautgewebes (Anasarka), Kältegefühl, Schüttelfrost, Gewichtsverlust. *Gelegentlich:* Herpes zoster, Herpes simplex, Nasopharyngitis, Pneumonie, Sinusitis, Zellulitis, Infekt. d. oberen Atemwege, Influenza, Harnwegsinfekt., Gastroenteritis, Sepsis, Thrombozythämie, Lymphozytop., Knochenmarksdepression, Eosinophilie, Lymphadenopathie, Hypokalämie, verstärkter Appetit, Hypophosphatämie, verm. Appetit, Dehydratation, Gicht, Hyperurik., Hyperkalz., Hyperglyk., Hyponatri., Depression, verm. Libido, Angstzustände, Migräne, Schläfrigkeit, Synkope, periph. Neuropathie, Gedächtnisschwäche, Ischiasbeschw., „Restless-Legs-Syndrom“, Tremor, Hirnblutung, Augenreizung, Augenschmerzen, Augenhöhlenödem, Glaskörperhämorrhagie, Retinablutungen, Blepharitis, Makulaödem, Schwindel, Tinnitus, Hörverlust, Palpitationen, Tachykardie, Stauungsherzinsuf., Lungenödem, Hypert., Hämatom, subdurales Hämatom, periph. Kältegefühl, Hypotonie, Raynaud-Syndr., Pleuraerguss, Rachen- und Kehlkopfschm., Pharyngitis, Stomatitis, Mundulzera, Blut. i. Gastrointestinaltrakt, Aufstoßen, Meläna, Ösophagitis, Aszites, Magengeschwür, Hämatemesis, Lippenentzündung, Dysphagie, Pankreatitis, Hyperbilirubinämie, Hepatitis, Gelbsucht, pustulöser Hautausschlag, Kontusion, vermehrtes Schwitzen, Urtikaria, Hautblut., verstärkte Tendenz zu blauen Flecken, Hypotrichose, Hypopigmentierung d. Haut, exfoliative Dermatitis, Brüchigwerden d. Nägel, Follikulitis, Petchien, Psoriasis, Purpura, Hyperpig. d. Haut, bullöser Hautausschlag, Pannikulitis, Gelenk- und Muskelsteifigkeit, Osteonekrose, Nierenschm., Hämaturie, ak. Nierenvers., erhöhte Miktionsfrequ., Gynäkomastie, erektile Dysfkt., Menorrhagie, unregelm. Menstruation, Stör. d. Sexualfkt., Schm. d. Brustwarzen, Brustvergrößer., Scrotumödem, Brustschm., allgem. Krankheitsgefühl, Erhöhd. Werte f. Kreatinin, Kreatinphosphokinase, Laktatdehydrogenase und alkal. Phosphatase i. Blut. *Selten:* Pilzinfekt., Tumor-Lyse-Syndrom, Hämolyt. Anämie, thromb. Mikroangiopathie, Hyperkaliämie, Hypomagnesiämie, Verwirrheitszust., erh. intrakranieller Druck, Konvulsionen, Sehnervenentzünd., Katarakt, Glaukom, Papillenödem, Arrhythmie, Vorhofflimmern, Herzstillstand, Myokardinfarkt, Angina pectoris, Perikarderguss, Rippenfellschm., Lungenfibrose, pulmon. Hypert., Lungenblut., Kolitis, Ileus, Darmentz., Leberversagen, Lebernekr., akute febr. neutroph. Dermatoze (Sweet-Syndr.), Verfärbung d. Nägel, angioneurot. Ödem, bläschenförm. Exanthem, Erythema multiforme, leukozytoklastische Vaskulitis, SJS., akute generalis. exanthematöse Pustulose (AGEP), Pemphigus, Muskelschwäche, Arthritis, Rhabdomyolyse/Myopathie, Hämorrhag. Corpus luteum/hämorrhag. Ovarialzyste, erhöhte Amylase-Werte i. Blut. *Nicht bekannt:* Hepatitis-B-Reaktivierung, Tumorblutungen/-nekrose, anaphylakt. Schock, Hirnödem, Glaskörperhämorrhagie, Perikarditis, Herztamponade, Thrombose/Embolie, akute respirat. Insuffizienz, interstit. Lungenerk., Ileus/Darmobstrukt., gastrointest. Perforation, Divertikulitis, gastral-antrale vaskul. Ektasie (GAVE), Hand-Fuß-Syndrom (palmar-plantare Erythrodyssäthesie), lichenoid. Keratose, Lichen planus, TEN, arzneimittelbedingter Hautausschlag m. Eosinophilie u. system. Sympt. (DRESS), Pseudoporphyrie, Wachstumsverzög. b. Kdr. u. Jugendl., chron. Nierenvers. **Verschreibungspflichtig.** *Weitere Informationen siehe Fach- und Gebrauchsinfo.* **Zulassungsinhaber:** Accord Healthcare S.L.U., World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n, Edifici Est 6ª planta, 08039 Barcelona, Spanien. **Örtlicher Vertreter:** Accord Healthcare GmbH, Hansastraße 32, 80686 München, info@accord-healthcare.de. **Stand:** 11-2022